

Clasificación de pacientes	Primera elección	Segunda elección
Adultos (no embarazadas)	Doxiciclina: 300 mg vía oral en una dosis	<ul style="list-style-type: none"> • Azitromicina: 1 gramo en una sola dosis • Tetraciclina: 500 mg, 4 veces al día, durante 3 días • Ciprofloxacina: 1 gramo en una sola dosis • Eritromicina: 500 mg, 4 veces al día, durante 3 días
Embarazadas	Azitromicina: 1 gramo en una dosis	Eritromicina: 500 mg, 4 veces al día, durante 3 días
Niños \geq 12 meses y capaces de tragar píldoras y/o comprimidos	<ul style="list-style-type: none"> • Azitromicina: 20 mg/kg en una dosis • Eritromicina: 12,5 mg/kg, 4 veces al día, durante 3 días • Doxiciclina: 2-4 mg/kg en una dosis 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciprofloxacina: 20 mg/kg en una dosis • Tetraciclina: 12,5 mg/kg, 4 veces al día, durante 3 días
Niños $<$ 12 meses y otros incapaces de tragar píldoras y/o comprimidos	<ul style="list-style-type: none"> • Azitromicina, suspensión oral: 20 mg/kg en una dosis • Eritromicina, suspensión oral: 12,5 mg/kg, 4 veces al día, durante 3 días • Doxiciclina, suspensión oral: 2-4 mg/kg en una dosis 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciprofloxacina, suspensión oral: 20 mg/kg en una dosis • Tetraciclina, suspensión oral: 12,5 mg/kg, 4 veces al día, durante 3 días