

Anafilaxia o Reacción Vasovagal Comparación de Signos y Síntomas

Signos y Síntomas	Reacción Vasovagal	Anafilaxia
Periodo de tiempo (después de la inyección)	A veces antes, generalmente después de unos segundos a unos minutos después de la inyección.	Dentro de los 30 minutos posteriores a la inyección; las reacciones más graves comienzan dentro de los primeros 15 minutos
Consciencia	Sensación de desmayo, mareos, pérdida del conocimiento en algunos casos.	Ansiedad, que puede progresar hasta la pérdida del conocimiento en casos graves
Respiración	Lento, con algunos segundos de apnea en algunos casos	Dificultades respiratorias; tos, estornudos, sibilancias, estridor
Pulso	Lento y débil, pero normal	Rápido, débil y irregular
Piel	Diaforesis, piel húmeda, palidez	<ul style="list-style-type: none"> • Piel cálida, que progresa a húmeda y palidez • Prurito y urticaria (>90% de casos) • Hinchazón de cara y lengua
<u>Presión Sanguínea</u>	Hipotensión	Hipotensión (presión sistólica <90 mm Hg), que puede progresar a colapso cardiovascular
Sistema Gastrointestinal	Nauseas, vómitos	Nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea
Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque al cliente en una posición reclinada y eleve las piernas por encima de la cabeza (o haga que el cliente se siente con la cabeza entre las rodillas). • Ventile bien el sitio • Coloque un paño húmedo y frío en la cara • Hay que dar consuelo al paciente 	Vea Manitoba Health <i>Protocol for the Management of Suspected Anaphylaxis</i> (Protocolo Para el Manejo de Sospecha de Anafilaxia)
Prevención	No vacune a una persona de pie. Antes de vacunar, pregunte si la persona tiende a desmayarse; si es así, pídale a la persona que se acueste	Antes de vacunar, pregunte si la persona ha tenido alguna vez una reacción anafiláctica con algún producto; En caso afirmativo, pregunte por el nombre del producto y decida en consecuencia.